

Практика 3. Оценка дисперсии как случайная величина.
Стандартизированная и стьюдентизированная случайная величина.

Часть 1. Распределение χ^2 .

- Используя только нормальный генератор `randn()` написать генератор СВ из распределения χ^2 с k степенями свободы.

```
function x = randchi2(k, n)
```

k – количество степеней свободы распределения χ^2

n – объем генерируемой выборки

x – вектор размерности n со случайными значениями из случайной величины χ^2

- Выбрать количество степеней свободы $2 \leq k \leq 10$ и, используя написанный генератор, методом Монте-Карло сгенерировать достаточно большую выборку, построить ее полигон относительных частот (`hist_density`).
- На том же графике построить теоретическую плотность распределения χ^2 с выбранным числом степеней свободы. Убедиться, что графики совпадают.

Часть 2. Оценка дисперсии как случайная величина

- Задаться объемом исследуемой выборки $3 \leq n \leq 6$.
- Задаться объемом выборки Монте-Карло $N > 1000$.
- Сгенерировать N реализаций смещенной и несмещенной оценок дисперсий, рассчитанных по выборкам объема n . Построить полигон относительных частот обеих оценок. Визуально продемонстрировать наличие смещенностей.
- На основе N реализаций несмещенной дисперсии построить столько же реализаций величины $\frac{s^2}{D}$. Построить полигон относительных частот. Выяснить в лекциях теоретическую плотность распределения $\frac{s^2}{D}$ и нанести ее на тот же график. Убедиться, что графики совпадают.

Часть 3. «Стандартизированная» и «стьюдентизированная» случайная величина

Суть этой части сравнение распределений статистики на основе

- Задаться дисперсией распределения нормальной случайной величины. МО считать равным нулю.
- Задаться объемом исследуемой выборки $2 \leq n \leq 4$.
- Задаться объемом выборки Монте-Карло $N > 1000$ и сгенерировать N выборок объема n по заданной СВ. По каждой выборке построить:
 - средневыборочное \bar{x}_n
 - стандартизованное средневыборочное z (поделить \bar{x}_n на его истинное с.к.о.)
 - оценку с.к.о. s
 - стьюдентизированное средневыборочное t (поделить \bar{x}_n на оценку его с.к.о.)

Во всей первой части задания цикл моделирования Монте-Карло должен быть ровно один, чтобы все расчеты шли по одним и тем же выборкам. Код с нарушением этого требования не принимается.

- Построить полигон относительных частот и теоретическое распределение \bar{x}_n .
- Сравнить распределения
- Построить полигон относительных частот и теоретическое распределение стандартизованного средневыборочного z
- Изменяя n , исследовать при каком объеме выборки распределение Стьюдента сходится к нормальному стандартному.

Вопросы к защите

1. Что такое несмешенность оценки? При каком объеме выборке проявляется смещенность смещенной оценки дисперсии.
2. Что такое дисперсия оценки дисперсии? Как ее увеличение влияет на полигон относительных частот оценок дисперсии? От чего она зависит?
3. Что такое матожидание оценки дисперсии. Вывести МО смещенной и несмешенной оценок дисперсии.
4. Вывести распределение оценки дисперсии при известном истинном значении МО:

$$\widehat{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - Ex)^2$$

5. Доказать смещенность оценки дисперсии:

$$\widehat{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$$

6. Чем похожи и чем отличаются стьюдентизированная и стандартизированная нормальная случайная величина. Можно ли стьюдентизировать СВ, у которой распределение не нормальное?